

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

**ÉDITION DE LA STATION DE RHONE-ALPES** (Tél. 37-20-56)  
(AIN, ARDECHE, DROME, HAUTE-SAVOIE, ISERE, LOIRE, RHONE, SAVOIE)  
Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux. 4, place Gensoul - LYON.  
C. C. P. : LYON 9.430-12

ABONNEMENT ANNUEL  
**12 NF**

1er Supplément au Bulletin N° 6 de Mars 1961

## AVERTISSEMENTS

### TAVELURE DU POMMIER ET DU POIRIER

Sur poirier: le premier traitement devra être renouvelé si possible avant la floraison  
Sur pommier: un traitement devra être appliqué dans les régions suivantes dès réception:  
AIN: en totalité sauf région 43 - ARDECHE: néant - DROME: 123 et 127  
ISERE: en totalité sauf 101 et 103 - LOIRE: 2, 5, 6 et 7  
RHONE: 6, 30, 31, 32, 33, 34 et 36 - SAVOIE et HTE SAVOIE: en entier  
Ce traitement pourra être éventuellement combiné avec celui de l'Oïdium

CECIDOMYIE DES POIRES: Dans les localités où la présence de cet insecte responsable des poires "calebassées" a été constatée au cours des printemps précédents, appliquer avant le 24 mars un traitement à base de D.D.T. ou d'H.C.H. à 100gr/hl de matière active ou de Lindane à 12gr/hl de matière active.

## INFORMATIONS

PUCERONS VERT DU POMMIER ET NOIR DU PECHER: Ces insectes devront être surveillés et un traitement appliqué dès l'apparition des premières colonies.

BRYOBE: Cet acararien a déjà fait son apparition notamment sur pommier et les températures élevées favorisent de nouvelles éclosions. On devra adjoindre aux traitements ci-dessus un des 5 premiers produits indiqués dans la liste (1ère page, 1ère colonne) à condition de traiter à température supérieure à 18° et dans la limite des compatibilités.

MONILLIA DU CERISIER: Appliquer avant la floraison un traitement cuprique à raison de 250gr/hl de cuivre-métal.

HOPLOCAMPE DU PRUNIER: Cet insecte attaque le fruit dès sa nouaison et laisse après sa sortie un trou rond de 2 à 3mm de diamètre. Dans les localités où de tels dégâts avaient été constatés au cours des saisons précédentes, appliquer dès la chute des pétales une des formules suivantes:

H.C.H. à 100gr/hl de mat.active	Parathion éthyle à 20gr/hl de mat.active
Lindane à 12gr/hl " "	" méthyle à 30gr/hl " "
Roténone à 20gr/hl " "	

ANTHRACNOSE DU FRAMBOISIER: Après avoir éliminé tous les rameaux de 1960 atteints par diverses maladies, appliquer un traitement au cuivre (250gr/hl de cuivre) ou au captane (250 à 350gr/hl de produit commercial).

Sur groseillier, détruire les pousses atteintes par la sésie.

MELIGETHE DU COLZA: Appliquer dès avant la floraison une des formules indiquées sur la liste (2ème page, 2ème colonne).

L'Inspecteur de la Protection  
des Végétaux: A.PITHIoud

Le Contrôleur chargé des  
Avertissements Agricoles: P.LATARD

7300